



Con autorización para Uso en Agricultura Orgánica Nacional, Decreto Supremo 2/2016, Departamento de Agricultura Orgánica - Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.



AHUYENTADOR BIODINÁMICO DE PÁJAROS Y AVES MENORES

➔ CARACTERÍSTICAS / PROPIEDADES BIOFÍSICAS

BirdCare® Top, es un “ahuyentador Biodinámico Homeopático”, “Remedio o Preparado Biodinámico Holístico”, diluido en Agua Estructurada. Basado en el “principio de la electro-magneto hidrodinámica”.

Es “absorbido energéticamente” por la planta y suelo del lugar tratado, armonizando y equilibrando la escala de la frecuencia de longitud de onda que atrae y distorsiona a los pájaros durante periodos específicos, de acuerdo al cultivo y condición, provocando en el área tratada un estado de restauración y armonía. Producto de todas estas interacciones, las poblaciones excedentes de pájaros se disipan, quedando sólo los necesarios para reestablecer un sano equilibrio del ecosistema.



AHUYENTADOR BIODINÁMICO



REMEDIO HOLÍSTICO



ABSORBIDO ENERGÉTICAMENTE



PRINCIPIO ELECTRO-MAGNETO HIDRODINÁMICA

DEBIDO A SU GRAN INOCUIDAD BirdCare® Top **ESTÁ RECOMENDADO** para su uso en agricultura ecológica, sustentable y convencional sin residuos. No tóxico. Biodegradable. Sin carencia. Amigable y respetuoso con el medio ambiente.

BirdCare® Top **NO ES UN PRODUCTO TÓXICO** a organismos acuáticos, peces, aves, animales, abejas, ni microorganismos.

BirdCare® Top, **PUEDE SER USADO EN TODO TIPO DE CULTIVOS.** Recomendado especialmente para frutales, uva de mesa, vinífera, cerezo, manzano, arándano, frutilla, hortalizas, viveros, semilleros, cereales, praderas, césped, áreas verdes y ornamentales.

USO DE AGUA ESTRUCTURADA



NO TÓXICO Y BIODEGRADABLE



ARMONIZACIÓN Y EQUILIBRIO



USO EN TODO TIPO DE CULTIVOS



➔ RECOMENDACIONES DE USO INDEPENDIENTE DEL VOLUMEN DE AGUA Y MAQUINARIA EMPLEADA

PRIMERA APLICACIÓN

Primera y segunda aplicación debe ser foliar con dosis de 500 ml de BirdCare® Top /ha, cuidando formar una gran nube sobre el cultivo con buena cobertura.

SEGUNDA APLICACIÓN

TERCERA APLICACIÓN

A partir de la tercera aplicación en adelante la dosis es de 250 ml de BirdCare® Top /ha, vía foliar o fertirriego.

IMPORTANTE

Las dos primeras aplicaciones deben cubrir no sólo al cultivo que se quiere proteger, si no también, los borde y caminos internos de la zona a tratar.

OTROS CONSEJOS

Para un buen resultado, se recomienda **NO** interrumpir el programa de aplicaciones semanales hasta observar un evidente alejamiento de pájaros y una buena impresión del huerto. Aplicar de preferencia muy temprano en la mañana, al atardecer o en la noche.

IMPORTANTES NOTAS A CONSIDERAR

- ✓ Llenar el estanque o recipiente con agua, **manteniendo agitación constante durante 10 minutos**, para activar el agua y formar vórtices. . Luego agregar BirdCare® Top lentamente.
- ✓ **Almacenar en lugar fresco y oscuro**, alejado de corrientes eléctricas, enchufes, luz directa y calor. **Una vez abierto, mantener en su envase original**, con su respectiva etiqueta.
- ✓ **NO CONTIENE** Metales pesados, cloruros, carbonatos o fluoruros. p H: 5,5 - 6.

➔ COMPATIBILIDAD

**NO MEZCLAR
CON NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO**
Sólo biocompatibles.

➔ NOTA AL COMPRADOR

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según instrucciones, se presta para los fines recomendados.

Como el almacenamiento y aplicación están fuera del alcance de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, **NO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE LA INOPERANCIA DEL PRODUCTO QUE PUEDA PRODUCIRSE POR CUALQUIER CONSECUENCIA DE SU MAL USO Y ALMACENAMIENTO INADECUADO .**

PRESENTACIÓN: 1; 5; 20 litros.

 **BIRD.
CARETOP**

TRATAMIENTO

CULTIVO	1ª Y 2ª Aplicación	DOSIS SEMANAL POSTERIOR	MOMENTO IDEAL INICIO TRATAMIENTO
Uva de Mesa, Vinífera, Pisquera, Cerezo, Manzano, Peral.	500 ml/ ha	250 ml/ha	En "ablande", antes de pinta, y hasta un 10% a 30 % de pinta, según variedad y condición de las plantas.
Almendro, Nectarín, Durazno, Ciruelo, Nogal, Avellano, Granada.	500 ml/ ha	250 ml/ha	Desde antes de flor. Y hasta un 20% a 40% de flor. Según especie y condición del huerto.
Arándano, Frutilla, Frambuesa, Mora, Grosella, Zarparrilla.	500 ml/ ha	250 ml/ha	Antes de pinta, hasta un 5% a un 10% de pinta según variedad y especie y condición del huerto.
Hortalizas	500 ml/ ha	250 ml/ha	Según observación.
Maíz	500 ml/ ha	250 ml/ha	25 días antes de maduración.
Cereales de grano: Arroz, Trigo, Avena, Cebada, Sorgo.	500 ml/ ha	250 ml/ha	25 días antes de maduración.
Maravilla	500 ml/ ha	250 ml/ha	25 días antes de maduración.
Semilleros	500 ml/ ha	250 ml/ha	Realizar una o dos aplicaciones Pre-Siembra, luego una aplicación semanal Post Siembra.
Praderas y Prados	500 ml/ ha	250 ml/ha	Realizar una o dos aplicaciones Pre-Siembra, luego una aplicación semanal Post Siembra.
Áreas Verdes y Ornamentales	500 ml/ ha	250 ml/ha	Durante periodos de susceptibilidad



FABRICADO POR :



LSM
Healing Remedies®
Sistemas Vibracionales para
Plantas Animales y Seres Humanos

WWW.AGROCARECHILE.CL

+56 9 92256460 / +56 9 54262209